

Formulário de Solicitação de Medicamentos – Hepatite B

Para solicitação de medicamentos, o preenchimento dos campos de 1 a 33 deve ser realizado obrigatoriamente pelo médico.

JULHO/2025

1 - CNS – Cartão Nacional de Saúde	2 - CPF*	3 - SINAN	4 - Prontuário
------------------------------------	----------	-----------	----------------

5 - Nome Completo do Usuário - Civil*

6 - Nome Social

7 - Início de tratamento?*	8 – Este formulário é válido por:*	9 - Origem do acompanhamento médico*	10 - Peso:*	11 - CID-10*
☐ Sim ☐ Não	☐ 30 dias ☐ 90 dias ☐ 150 dias ☐ 60 dias ☐ 120 dias ☐ 180 dias	☐ Público ☐ Privado		☐ B16.2 ☐ B16.9 ☐ B18.1 ☐ B17.0 ☐ B18.0 ☐ B16.0 ☐ B16.1

12 - Paciente coinfectado?*	13 - Exame de HBeAg:*	14 - Exame de ALT?*	15 - Exame de HBV-DNA:*	16 - Gravidade de cirrose (Child-Pugh)*
☐ Sem Coinfecção ☐ HIV ☐ Hepatite C ☐ Hepatite Delta	☐ Reagente ☐ Não Reagente	☐ Maior que 1,5 vezes LSN ☐ Menor que 1,5 vezes LSN	Resultado: _____ UI/mL Data: ____/____/____	☐ Sem Cirrose ☐ Child A ☐ Child B ou C

17 - Exame de anti-HDV IgG:	18 - Exame de HDV-RNA:	19 - Resultado Beta-HCG?*	20 - Diagnóstico Materno (apenas se beta-HCG Positivo):
(obrigatório para CIDs B16.0, B16.1, B17.0 e B18.0) ☐ Reagente ☐ Não Reagente	(obrigatório para CIDs B16.0, B16.1, B17.0 e B18.0) ☐ Detectável ☐ Não detectável	☐ Positivo ☐ Negativo ☐ Uso de métodos contraceptivos de alta eficácia ou definitivos	☐ Data do diagnóstico ____/____/____ ☐ Idade gestacional _____ semanas de gestação

21 - Indicação terapêutica:*

☐ Tratamento da Hepatite B ☐ Prevenção da Transmissão vertical ☐ Prevenção da reativação viral

☐ Profilaxia da reinfeção pós-transplante hepático ☐ Profilaxia do profissional de saúde

22 - Situação para profilaxia da reativação viral:	23 - Doador apresenta:	24 - Receptor apresenta:	25 - Risco de reativação viral:	26 – Momento da profilaxia da reinfeção:
(obrigatório se prevenção da reativação viral) ☐ Terapia imunossupressora ou quimioterapia ☐ Candidatos a transplante de órgãos sólidos	(obrigatório se profilaxia da reinfeção ou prevenção da reativação viral por transplante) HBsAg ☐ Reagente ☐ Não Reagente ☐ Desconhecido Anti-HBc total ☐ Reagente ☐ Não Reagente ☐ Desconhecido	(obrigatório se Profilaxia da reinfeção ou prevenção da reativação viral por transplante) HBsAg ☐ Reagente ☐ Não Reagente Anti-HBc total ☐ Reagente ☐ Não Reagente	(obrigatório se Prevenção da reativação viral) ☐ Alto ☐ Moderado ☐ Baixo	(obrigatório se Profilaxia da reinfeção pós-transplante hepático) ☐ Pré-transplante hepático ☐ Pós-transplante hepático

27 - Risco de reinfeção pós-transplante hepático:

☐ Alto risco ☐ Baixo risco ☐ Muito baixo risco

(obrigatório se Profilaxia da reinfeção pós-transp. hepático)

28 - Necessidade de terapia preemptiva por risco de reativação: (Se baixo risco – campo 25):

☐ Sim ☐ Não

29 - Outros critérios para indicação de tratamento:*

☐ História familiar de carcinoma hepatocelular (CHC);

☐ Manifestações extra-hepáticas, como artrite, vasculites, nefropatia poliarterite nodosa, neuropatia periférica;

☐ Hepatite aguda grave (INR > 1,5; icterícia por mais de 4 semanas, encefalopatia ou ascite);

☐ Reativação de hepatite B crônica;

☐ Doença hepática avançada;

☐ Hepatite fulminante

☐ Paciente pediátrico (<18 anos) com ALT >=1,3x LSN por mais de 6 meses

☐ Paciente pediátrico com sinais clínicos, ultrassonográficos e endoscópicos de cirrose.

☐ Estadiamento de fibrose em zona cinzenta com critério clínico associado a um pior prognóstico da hepatite B crônica (sexo masculino, idade > 40 anos, história familiar de cirrose por HBV ou por causa desconhecida, ou presença de outras causas de hepatopatia);

☐ Biópsia hepática METAVIR maior ou igual a A2 e ou F2

☐ Elastografia hepática: EHT >9 kPa (níveis normais de ALT) ou >12 kPa (ALT entre 1 e 5x LSN), ou pSWE/ARFI ≥1,8 m/sec, ou 2D-SWE >10 kPa

☐ Profissional de saúde com risco aumentado de transmissão do HBV

☐ Não apresenta.

30 - O paciente apresenta alguma das seguintes condições?*

☐ Consumo atual de álcool e/ou drogas;	☐ Osteoporose e outras doenças do metabolismo ósseo	☐ Neoplasia recente
☐ Cardiopatia ou pneumopatia grave;	☐ Antecedente de transplante, exceto hepático	☐ Exacerbação aguda de hepatite viral
☐ Disfunção tireoidiana não controlada;	☐ Distúrbios hematológicos: anemia, leucopenia, plaquetopenia	☐ Insuficiência hepática grave
☐ Distúrbios psiquiátricos não tratados;	☐ Doença auto-imune	☐ Hepatite auto-imune
☐ Diabetes melito com histórico de crise hiperglicêmica aguda	☐ Alteração da função renal por uso prévio de tenofovir	☐ Nenhuma
	☐ Doença renal crônica	

31 - Contra-indicação ao uso de:*	32 - Apresentou resistência ou falha terapêutica ao uso de:*	33 – Uso prévio de:*
☐ Alfapecinterferona ☐ Tenofovir (TDF) ☐ Entecavir ☐ TAF ☐ Sem contra-indicação	☐ Alfapecinterferona ☐ Tenofovir ☐ Entecavir ☐ TAF	☐ Nenhum (Virgem de tratamento) ☐ Alfapecinterferona ☐ Tenofovir ☐ Entecavir ☐ TAF ☐ Lamivudina

34 - Registro de dispensação*

Para preenchimento exclusivo do médico	Para preenchimento exclusivo da farmácia
☐ Alfapecinterferona 2a 180mcg Aplicar 180mcg/1,73m ² , por via subcutânea, uma vez por semana.	Quantidade dispensada 1ª disp _____ 2ª disp _____ 3ª disp _____ 4ª disp _____ 5ª disp _____ 6ª disp _____
☐ Entecavir 0,5mg Tomar _____ comprimido(s), por via oral, uma vez ao dia.	Quantidade dispensada 1ª disp _____ 2ª disp _____ 3ª disp _____ 4ª disp _____ 5ª disp _____ 6ª disp _____
☐ Tenofovir (TDF) 300mg Tomar 1 (um) comprimido, por via oral, uma vez ao dia.	Quantidade dispensada 1ª disp _____ 2ª disp _____ 3ª disp _____ 4ª disp _____ 5ª disp _____ 6ª disp _____
☐ Tenofovir Alafenamida (TAF) 25mg Tomar 1 (um) comprimido, por via oral, uma vez ao dia.	Quantidade dispensada 1ª disp _____ 2ª disp _____ 3ª disp _____ 4ª disp _____ 5ª disp _____ 6ª disp _____
☐ Imunoglobulina humana anti-hepatite B 1.000UI Administrar 1.000 UI, por via intramuscular, 1(uma) vez ao mês.	Quantidade dispensada 1ª disp _____ 2ª disp _____ 3ª disp _____ 4ª disp _____ 5ª disp _____ 6ª disp _____

35 - Observação:

36 - Prescritor*

CRM: _____ RMS: _____ / UF: _____

Data: ____/____/____

(Carimbo e assinatura)

37 - Recibo (para preenchimento exclusivo pela farmácia)

1ª dispensação Data: ____/____/____ Dispensação para _____ Dias	4ª dispensação Data: ____/____/____ Dispensação para _____ Dias
2ª dispensação Data: ____/____/____ Dispensação para _____ Dias	5ª dispensação Data: ____/____/____ Dispensação para _____ Dias
3ª dispensação Data: ____/____/____ Dispensação para _____ Dias	6ª dispensação Data: ____/____/____ Dispensação para _____ Dias

(Assinatura do farmacêutico)

(Assinatura do usuário)

ORIENTAÇÕES GERAIS

- Os campos com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.
- As alternativas com ícone ☐ indicam que uma única resposta é possível.
- As alternativas com ícone ☐ indicam que mais de uma resposta é possível (múltipla escolha)

JULHO/2025

DETALHAMENTO DOS CAMPOS

- 01 – CNS - Cartão Nacional de Saúde:** Número a ser preenchido de acordo com o cartão nacional de saúde (cartão SUS) do(a) usuário(a).
- 02 – CPF:** Informar o número do CPF corretamente (preenchimento obrigatório). Esse item não será obrigatório para algumas exceções, que são: estrangeiros; pessoa em situação de rua no momento; pessoa privada de liberdade no momento; indígena. Caso o(a) usuário(a), por motivo de furto ou outro, esteja sem documentação, deve-se informar provisoriamente como “pessoa em situação de rua” e justificar nas observações para correções posteriores.
- 03 – SINAN -** Informar o número informado no Sistema de Informação de Agravos de Notificação.
- 04 – Número de Prontuário:** Número do Prontuário do(a) Usuário(a) SUS.
- 05 – Nome Completo do(a) Usuário(a) – Civil:** Nome completo do(a) usuário(a) SUS, sem qualquer abreviação, conforme um documento de identidade oficial (preenchimento obrigatório).
- 06 – Nome social:** De acordo com o decreto 8.727/2016, é a designação pela qual a pessoa transvesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida. Preencher apenas para os(as) usuários(as) que possuem nome social que divirja do nome de registro.
- 07 – Início de tratamento?** Informar se o paciente está iniciando o tratamento com este formulário ou não (já realizava tratamento para hepatite B). No caso de pacientes já em tratamento, as regras de inclusão no PCDT serão flexibilizadas.
- 08 – Este formulário é válido por:** Especificar por quanto tempo a prescrição é válida.
- 09 – Origem do acompanhamento médico:** Especificar se o receituário é de origem de estabelecimentos privados/planos de saúde ou do SUS.
- 10 – Peso:** Preencher com o peso atualizado do paciente em quilogramas
- 11 – CID-10:** Preencher com B16.0 (Hepatite **aguda** B com agente Delta (coinfecção), com coma hepático); B16.1 (Hepatite **aguda** B com agente Delta, (coinfecção), sem coma hepático); B16.2 (Hepatite **aguda** B sem agente Delta, com coma hepático); B16.9 (Hepatite **aguda** B sem agente Delta e sem coma hepático); B17.0 (Superinfecção Delta **aguda** de portador de hepatite B); B18.0 (hepatite viral **crônica** B com agente Delta) ou B18.1 (hepatite viral **crônica** B sem agente Delta)
- 12 – Paciente Coinfectado:** Se o(a) paciente não possui coinfecção ou se é coinfectado pelo HDV, HIV ou HCV.
- 13 – Exame de HBeAg:** Informar se o HBeAg é reagente ou não reagente. O preenchimento do campo não é obrigatório se o paciente apresentar: a) indicação para prevenção da reativação viral (Campo 21); ou b) hepatite aguda grave (Campo 29); ou c) Paciente em profilaxia da reinfecção no pós-transplante hepático (campo 26)
- 14 – Exame de ALT:** Informar se o exame de Alanina Aminotransferase (ALT) é maior ou menor do que uma vez e meia o limite superior da normalidade (LSN) do método.
- 15 – Exame de HBV-DNA:** Informar o resultado da carga viral da Hepatite B – HBV-DNA. O preenchimento do campo não é obrigatório se: a) paciente com indicação para prevenção da reativação viral (Campo 21); b) gestante com HBeAg reagente e idade gestacional >= 24 semanas; ou c) paciente com hepatite aguda grave ou hepatite fulminante (Campo 29); ou d) Paciente em profilaxia da reinfecção no pós-transplante hepático (campo 26)
- 16 – Gravidade da cirrose:** Informar qual a classificação da gravidade da cirrose de acordo com o score de Child-Pugh.
- 17 – Exame de anti-HDV IgG:** Informar se o anti-HDV é reagente ou não reagente. Obrigatório para pacientes com a CID-10 B16.0, B16.1, B17.0 ou B18.0.
- 18 – Exame de HDV-RNA:** Informar se o resultado da carga viral da Hepatite Delta (HDV-RNA) é detectável ou não detectável. Obrigatório para pacientes com a CID-10 B16.0, B16.1, B17.0 ou B18.0.
- 19 – Resultado bHCG para mulheres entre 12 – 49 anos:** Informa resultado do exame bHCG no caso de mulher ou homem trans em idade fértil.
- 20 – Diagnóstico materno:** O campo deve ser preenchido somente se paciente gestante (exame beta-HCG positivo), especificando data do diagnóstico e idade gestacional.
- 21 – Indicação terapêutica:** Informar qual a indicação terapêutica para a utilização dos medicamentos contra o vírus da hepatite B.
- 22 – Situação para profilaxia da reativação viral:** Informar a situação com risco de reativação viral a qual o paciente será submetido. O campo deve ser preenchido somente se a indicação terapêutica for prevenção da reativação viral.
- 23 – Doador apresenta:** Informar situação de HBsAg e Anti-HBc do doador do órgão sólido. O campo deve ser preenchido somente se a indicação terapêutica for: a) prevenção da reativação viral por transplante de órgão sólido (Campos 21 e 22) ou b) profilaxia da reinfecção pós transplante hepático (Campo 21).
- 24 – Receptor apresenta:** Informar situação de HBsAg e Anti-HBc do receptor do órgão sólido (paciente a ser tratado com antiviral). O campo deve ser preenchido somente se a indicação terapêutica for: a) prevenção da reativação viral por transplante de órgão sólido (Campos 21 e 22) ou b) profilaxia da reinfecção pós transplante hepático (Campo 21).
- 25 – Risco de reativação viral:** Informar a classificação de risco de reativação viral de acordo com os Quadros 14 e 15 do PCDT de Hepatite B e Coinfecções.
- 26 – Momento da profilaxia da reinfecção:** Informar o momento em que está sendo solicitado o tratamento medicamentoso quando houve indicação terapêutica de profilaxia da reinfecção pós-transplante hepático (Campo 21).
- 27 – Risco de reinfecção pós-transplante hepático:** Informar a classificação de risco de reinfecção de acordo com o Quadro 16 do PCDT de Hepatite B e Coinfecções.
- 28 – Necessidade de terapia preemptiva por risco de reativação viral:** Informar se há necessidade de estabelecer terapia preemptiva de acordo com o Capítulo 15 do PCDT de Hepatite B e Coinfecções.
- 29 – Outros critérios para indicação de tratamento:** Informar se o(a) paciente apresenta algumas das situações clínicas listadas, ou se não apresenta.
- 30 – O paciente apresenta alguma das seguintes condições?:** Informar se o paciente apresenta alguma(s) das condições listadas, ou se não apresenta.
- 31 – Contraindicação ao uso de:** Informar se o(a) paciente apresenta alguma contraindicação ao uso dos medicamentos listados, ou se não apresenta nenhuma contraindicação.
- 32 – Apresentou resistência ou falha terapêutica ao uso de:** Informar se o(a) paciente apresentou resistência ou falha terapêutica pelo uso dos medicamentos listados, ou se não apresentou.
- 33 - Uso prévio de:** Informar se o(a) paciente já fez uso de algum medicamento listado, ou se é virgem de tratamento.
- 34 - Medicamentos:** Elenco dos medicamentos para hepatite B no SUS: O médico deverá assinalar um “x” no esquema prescrito de acordo com o PCDT de Hepatite B e Coinfecções.
- 35 – Observação:** Inserir quaisquer observações que se façam necessárias para o processo de cadastro e dispensação de medicamentos para Hepatite B.
- 36 – Prescritor:** Assinatura e carimbo do médico responsável pela prescrição. Preencher com o CRM do profissional. Caso ele não esteja cadastrado, deve-se proceder a inserção no sistema.
- 37 - Recibo:** Assinatura do farmacêutico responsável pela dispensação e assinatura do usuário acusando o quantitativo de medicamentos recebidos naquela dispensação. Informar o número de dias a que cada dispensação se refere para que o sistema realize o cálculo do saldo de dias para a próxima retirada de medicamento.